

# **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ**

## **по вакцинации против гриппа в 2019 году**

Вакцинация против гриппа входит в Национальный календарь прививок РФ наравне с вакцинацией против дифтерии, столбняка, кори и др. инфекций.

**В последние 5 лет в Орловской области не зарегистрировано поствакцинальных осложнений при вакцинации против гриппа. Не было также случаев летального исхода или осложненного течения гриппа у привитых.**

Вакцинация детей против гриппа в сезоне 2019 года будет осуществляться вакциной Совигрипп (без консерванта).

Состав вакцины обновлен с учетом эпидемически актуальных штаммов вирусов гриппа подтипов А и типа В по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Вакцина предназначена для специфической профилактики гриппа у детей с 6 месяцев.

Вакцина вводится внутримышечно в область дельтовидной мышцы (в плечо), а детям до трех лет в передненаружную часть бедра. **Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.**

В день прививки проводится осмотр врача или фельдшера.

**Дети относятся к лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. Вовремя проведенная вакцинация обеспечивает защиту от опасных осложнений, приводящих к летальному исходу (пневмонии, менингоэнцефалита и др.)**

Вакцинацию проводят ежегодно в осенний период (лучшее время — сентябрь-октябрь). Детям в возрасте от 6 до 35 мес. включительно вводят по 0.25 мл двукратно с интервалом 28 дней. Детям старше 36 мес. и взрослым вакцину вводят однократно в дозе 0.5 мл.

Вакцина является высокоочищенным препаратом. Местные и общие реакции, как правило, отсутствуют. Иногда в области введения могут развиваться реакции в виде болезненности, отека, покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, легкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно проходят самостоятельно через 1-3 дня. Противопоказана вакцина лицам с аллергической реакцией на куриный белок, в период острых или обострения хронических заболеваний (вакцинация после выздоровления).

В составе вакцины содержится современный адьювант (совидон), который усиливает иммунный ответ. Если ребенку меньше 6 месяцев, желательно привить всех людей в окружении.

Сообщаем также, что в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий (гриппа) осуществляется временный отказ в приеме непривитых детей в образовательные и оздоровительные учреждения.

**Защитите себя и своего ребенка, сделайте прививку вовремя!**